

# Riduzione del danno da tabacco e Nuovi prodotti di tabacco

**INIZIO**



Dopo aver completato questo modulo sarai in grado di:

- 01 Definire i concetti di riduzione del danno e di “linea del rischio” in relazione al trattamento della dipendenza da tabacco negli adulti
- 02 Identificare come funzionano i nuovi prodotti di tabacco
- 03 Citare quanto i nuovi prodotti di tabacco forniscono nicotina rispetto alle sigarette convenzionali
- 04 Selezionare i rischi per la salute noti dei nuovi prodotti di tabacco
- 05 Elencare i motivi per cui i fumatori usano nuovi prodotti di tabacco
- 06 Applicare le nuove conoscenze sui rischi e sui potenziali benefici dei nuovi prodotti di tabacco nelle interazioni con i pazienti, sottolineando che l'astinenza completa dal fumo di sigaretta è l'obiettivo ottimale





**RIDUZIONE  
DEL DANNO  
DA TABACCO**

# OMS (o WHO) definizione di riduzione del danno del tabacco


**Riduzione del danno** (in relazione al tabacco): per ridurre la morbilità e la mortalità nei consumatori che continuano l'uso di tabacco e di nicotina che non sono disposti o capaci a smettere, con la dovuta considerazione degli effetti a livello di popolazione.

Le basi scientifiche del regolamento sui prodotti del tabacco.  
Riduzione del danno e prodotti di tabacco senza fumo: le raccomandazioni, le normative e le esigenze della ricerca


[https://www.who.int/tobacco/global\\_interaction/tobreg/publications/9789241209519.pdf](https://www.who.int/tobacco/global_interaction/tobreg/publications/9789241209519.pdf)



LE CINTURE DI SICUREZZA  
RIDUCONO IL RISCHIO DI MORTE




LE CINTURE DI SICUREZZA  
RIDUCONO IL RISCHIO DI LESIONI  
GRAVI



3 PERSONE SU 4 CHE VOLANO FUORI DALL'AUTO  
DURANTE UN INCIDENTE MORTALE E MUOIONO  
A CAUSA DELLE LORO FERITE.



**30 VOLTE**




LE PERSONE CHE NON INDOSSANO UNA CINTURA DI  
SICUREZZA HANNO UNA PROBABILITÀ MAGGIORE DI  
VOLARE FUORI DA UN VEICOLO DURANTE UN INCIDENTE

## OBIETTIVO FINALE



**Completa cessazione  
dell'uso di tabacco!**





Ho provato tante volte a smettere di fumare ... ma le mie voglie di nicotina sono troppo forti!







## Cerotto

16h (25mg, 15mg, 10mg, 5mg)  
24h (21mg, 14mg, 7mg)



## Inalatore

10mg (per cartuccia)  
2mg (assorbito)



## Spray Orale

1mg per spray/dose



## Gomma

2mg, 4mg



## Pastiglie e compresse sublinguali

1 a 4 mg



## Dichiarazioni sulla sicurezza



## Svapo



Public Health  
England

Protecting and improving the nation's health

## Evidence review of e-cigarettes and heated tobacco products 2018

A report commissioned by  
Public Health England

 INDEPENDENT

 JOIN US? SUBSCRIBE REGISTER

LOGIN



NEWS VOICES SPORT CULTURE **INDY/LIFE** INDYBEST VIDEO DAILY EDITION COUPONS




### Government says vaping 95% safer than smoking in push to get smokers to switch to e-cigarettes

Public Health England to counter 'false fears' over vaping's safety




# Linea del rischio



- L'introduzione di un nuovo prodotto o processo i cui effetti finali sono contestati o sconosciuti dovrebbe essere contrastato (Dizionario di Oxford)
- Importante nelle interazioni tra fornitori e pazienti



A close-up photograph of a hand holding several lit cigarettes. The hand is positioned on the left side of the frame, with fingers gripping the cigarettes. The cigarettes are lit, with visible smoke and ash. The background is a plain, light grey color. The image is framed by a white, jagged, hexagonal border that extends into the text area on the right.

"Non c'è niente di più potente che si può fare per i pazienti che fumano che aiutarli a smettere".

**Congratulazioni! Hai  
completato il Corso di  
riduzione del danno.**

